IT

CURASEPT®
FIRST BECAUSE WE CARE
DRYMOUTH

QUADRO CLINICO dell'**IPOSALIVAZIONE** e della **BOCCA SECCA**

La saliva è fondamentale per molti aspetti della salute del paziente, come masticazione, preparazione del bolo alimentare, deglutizione, difesa di denti e mucose, controllo del biofilm orale e percezione dei sapori.

L'iposalivazione, ovvero la riduzione della produzione della saliva, di grado lieve o moderato, può portare ad una riduzione delle difese a livello locale con conseguente aumento del rischio di carie, fallimenti precoci dei restauri dentali e difficoltà a mantenere le gengive in buono stato prive di infiammazioni.
I fattori difensivi contenuti nella saliva non riescono a garantire un'azione efficace contro placca e batteri se il flusso salivare si riduce. Maggiore è la riduzione del flusso, maggiore è l'incidenza dei sintomi descritti. Con la bocca asciutta aumentano i disturbi, per lo sfregamento dei tessuti duri dentali e la riduzione della protezione delle mucose.

CAUSE della BOCCA SECCA

Tra le principali cause della bocca secca, alcune hanno un'origine **iatrogena**, ovvero dovuta a terapie mediche o farmacologiche (circa 500 farmaci, infatti possono ridurre la secrezione di saliva), altre sono legate a patologie che direttamente o indirettamente coinvolgono la funzionalità delle ghiandole salivari, a cui si aggiungono i trattamenti oncologici chemioterapici e radioterapici.

Le principali condizioni mediche e patologie che possono influire sulla secrezione salivare sono:
- Diabete
- Ansia e depressione
- Fibrosi cistica
- Ipertiroidismo
- Parotiti croniche
- Scialoadeniti,
- Sindrome di Sjögren
- Sarcoidosi
- Infezioni da Hiv e Hcv
- Gravi nefropatie
- Gravi disidratazioni

CONSEGUENZE cliniche dell'**IPOSALIVAZIONE** e della **BOCCA SECCA**

La riduzione o l'assenza della salivazione porta a conseguenze cliniche come:
- Aumentata frequenza di lesioni cariose in particolare della zona cervicale degli elementi dentari, soprattutto negli anziani.
- Aumentato rischio di gengivite e malattie parodontali
- Disfagia (difficoltà alla deglutizione)
- Disgeusia (alterazione della percezione dei sapori)
- Predisposizione alle infezioni da candida e altri microrganismi opportunisti
- Bruciore alla mucosa orale
- Secchezza e ragadi delle labbra
- Gonfiore delle ghiandole salivari

Il trattamento di iposalivazione e bocca asciutta ha come obiettivo la riduzione della sensazione di secchezza, la protezione dai fenomeni irritativi della mucosa e dall'aumento della cariorecettività. A questo scopo vengono impiegati prodotti umettanti, prodotti idratanti e sostituti salivari per ottenere un'azione protettiva delle mucose orali e ridurre significativamente la sensazione di secchezza.

I prodotti della linea **CURASEPT DRYMOUTH** grazie alla formula arricchita con **MHS (Mouth Hydration System)**, un mix equilibrato di sostanze idratanti, donano una immediata e prolungata sensazione di benessere al cavo orale. L'azione sinergica tra elementi già presenti nella naturale composizione della saliva e agenti antiplacca favorisce la protezione del cavo orale, riducendo il rischio di carie e stimolando l'idratazione delle mucose orali.

I prodotti **CURASEPT DRYMOUTH** inoltre hanno un gusto delicato, non irritano la mucosa orale e sono appositamente studiati per un uso quotidiano.

COLLUTORIO flacone da 500 ml

Il collutorio favorisce un'immediata e duratura sensazione di benessere, grazie all'azione sinergica di sostanze idratanti e di sostanze filmanti, atte ad avvolgere e proteggere la mucosa orale indebolita e particolarmente sensibile.
MODO D'USO Effettuare uno sciacquo per circa 1 minuto utilizzando un cucchiaio o un tappo di prodotto non diluito (circa 10 ml). Per prolungare i benefici apportati dalla formulazione non mangiare o bere per almeno un'ora. Ripetere l'applicazione da 2 a 5 volte al giorno, preferibilmente dopo la normale igiene orale. Il prodotto è per uso quotidiano. Se ne consiglia l'uso in abbinamento al dentifricio, gel e spray Drymouth. Per adulti e bambini a partire dai 7 anni.
AVVERTENZE • Non deglutire-uso esterno • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Tenere al riparo da fonti di luce e calore • Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente • Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti.

DENTIFRICIO tubo da 75 ml

Il dentifricio, grazie alla presenza di agenti antiplacca e del Fluoro, favorisce la protezione del cavo orale, riducendo il rischio di carie e proteggendo le mucose da agenti batterici.
MODO D'USO Utilizzare prodotto quotidianamente, almeno due volte al giorno, con uno spazzolino CURASEPT SOFT. Per prolungare i benefici apportati dalla formulazione si consiglia di non mangiare o bere per almeno un'ora. Si consiglia l'abbinamento con il collutorio, il gel e lo spray Curasept Drymouth. Per adulti e bambini a partire dai 7 anni.
AVVERTENZE • Non deglutire-uso esterno • Contiene 1450 ppm F^-, il prodotto può essere usato solo da persone adulte • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Tenere al riparo da fonti di luce e calore • Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente • Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti.

GEL tubo da 50 ml

Il gel, grazie alla presenza di sostanze filmanti e adesive, è particolarmente adatto per l'uso prima di andare a dormire, quando durante il sonno non ci si vuole svegliare di continuo con la necessità di bere.
MODO D'USO Applicare una piccola quantità di prodotto sulla lingua e su tutta la mucosa orale con un dito pulito o delicatamente con l'apposito spazzolino CURASEPT SOFT, preferibilmente prima di andare a dormire. Si consiglia l'abbinamento al collutorio e al dentifricio Drymouth. Per adulti e bambini a partire dai 3 anni.
AVVERTENZE • Non deglutire-uso esterno • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Tenere al riparo da fonti di luce e calore • Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente • Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti.

SPRAY flacone da 50 ml

La formulazione in spray consente di alleviare i sintomi da secchezza orale in ogni momento, anche quando il collutorio risulta poco agevole: fuori casa, al lavoro, accanto al letto, durante conversazioni e nelle situazioni in cui sarebbe difficile intervenire.
MODO D'USO Agitare lo spray. Effettuare 3 o 4 spruzzi, sino a 10 volte nell'arco della giornata. Per prolungare i benefici si consiglia di non mangiare o bere per almeno un'ora. Si consiglia l'associazione collutorio, gel e dentifricio Curasept Drymouth. Per adulti e bambini a partire dai 3 anni.
AVVERTENZE • Non deglutire-uso esterno • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Tenere al riparo da fonti di luce e calore • Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente • Non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia a uno o più componenti.

La linea di CURASEPT per la bocca secca comprende anche un Integratore alimentare a base di Vitamina E e D.

Confezione da 30 cpr.

Per maggiori informazioni visita il sito **www.curasept.it**

MADE IN ITALY

FOGLIETTO 22 PAP Carta
RACCOLTA DIFFERENZIATA VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE

12/2024
XDP-00034

CURASEPT S.p.A.
Via G. Parini 19 -21047 Saronno (VA) Italy
info@curaseptspa.it - **www.curasept.it**