LA SALUTE INIZIA DALLA BOCCA

LA PLACCA BATTERICA

La placca batterica è uno dei principali nemici della salute della bocca.
È un ammasso di microrganismi immersi in una "matrice" organica, prodotta dalla loro attività cellulare. Non viene rimossa dall'azione detergente naturale della saliva, della lingua, dei movimenti di labbra e guance e si forma indipendentemente dall'introduzione di cibo, per via dei microrganismi normalmente presenti nella bocca. I residui alimentari, specialmente gli zuccheri, forniscono ai batteri sostanze nutritive che ne favoriscono l'accumulo.

La placca si può ritrovare sui denti ma anche sulla lingua e sulle tonsille, e si forma più facilmente nelle zone difficilmente raggiungibili durante le manovre quotidiane di igiene orale.

I RISCHI E LE CONSEGUENZE DELL'ACCUMULO DI PLACCA

ALITOSI: La decomposizione dei batteri della placca produce gas e sostanze che causano il tipico odore sgradevole dell'alito.

CARIE: Il metabolismo di alcuni batteri della placca libera sostanze acide che demineralizzano lo smalto avviando il processo della carie. Se il danno avanza, la carie giunge alla dentina e penetra fino alla polpa, generando dolore.



Formula con Polinucleotidi | DNA: stimola i processi di riparazione dei tessuti gengivali e contribuisce a ridurre i sintomi infiammatori.

GENGIVITE: Placca, tartaro e le tossine prodotte dai batteri possono causare infiammazione, sanguinamento e ipersensibilità.
Le manovre di igiene orale possono diventare difficoltose o anche dolorose per la presenza della gengivite.



La gengiva si infiamma e si La gengiva si infiamma e si ritrae per effetto di placca e tartaro

MALATTIA PARODONTALE:
Quando placca e tartaro non vengono rimossi, l'infiammazione continua ad aggravarsi fino a formare le "tasche" parodontali, spazi tra la radice e il dente dove i batteri possono annidarsi e proliferare.
Nelle fasi terminali, con la progressiva distruzione dei tessuti, il dente inizia a muoversi perdendo il suo ancoraggio alveolare fino alla caduta.



La placca penetra sempre di più, il dente perde il suo sostegno.

CURASEPT ADS|DNA

La **CLOREXIDINA** è un principio attivo impiegato per la preparazione di collutori e dentifrici grazie alla sua elevata **azione antiplacca e antibatterica.**
Le sue proprietà, clinicamente dimostrate, dipendono dal suo esclusivo meccanismo d'azione.
La linea Curasept **Clorexidine Associate** caratterizzata dalla combinazione della Clorexidina Digluconato con i Polinucleotidi (DNA/RNA) e altre sostanze funzionali:

- l'**Hamamelis Virginiana**, per un'azione astringente nel caso di gengive sanguinanti
- il **Clorobutanolo**, per un'azione lenitiva del dolore
- l'**Acido Ialuronico**, per un'azione rigenerante dopo trattamenti odontoiatrici complessi ad esempio l'inserimento di impianti
- il **Colostro**, per un'azione protettiva delle mucose più sensibili o indebolite da patologie o fumo.

I **POLINUCLEOTIDI** stimolano i processi di riparazione del tessuto gengivale e riducono i sintomi infiammatori.
L'azione combinata di Clorexidina e Polinucleotidi consente il mantenimento di denti e gengive sane per una protezione completa di tutta la bocca contro gli attacchi quotidiani dei batteri della placca.

ANTI DISCOLORATION SYSTEM NEW*

Il sistema ADS, perfezionato con N-Acetil-Cisteina* (NAC) che ne potenzia l'attività, interferisce con tre dei principali meccanismi della pigmentazione e contribuisce a diminuirne l'incidenza e l'entità, proteggendo il bianco dei denti.
*Brevetto Concesso

Collutorio e Dentifricio TRATTAMENTO PLACCA E CARIE CLOREXIDINA 0.05% CON ADS NEW + FLUORO 0.05% + DNA



Proprietà:
Azione antiplacca e remineralizzante. Protettivo delle gengive e dello smalto dentale per trattamento quotidiano. Senza alcool.

Indicazioni:
Per il controllo della placca batterica ad integrazione o in sostituzione delle normali manovre di igiene orale meccanica.
L'azione remineralizzante del fluoro unita all'attività antiplacca della clorexidina a basse concentrazioni, ne permettono un uso quotidiano. Mantiene le gengive in buono stato.
Particolarmente indicato nei soggetti portatori di apparecchi ortodontici e ad alta cariorecettività. L'assenza di alcool che evita effetti irritanti e dolorosi, la presenza del sistema ADS®, che diminuisce l'incidenza delle possibili pigmentazioni, conferiscono al prodotto un'ottimale compliance (accettabilità).

Dentifricio TRATTAMENTO PROLUNGATO CLOREXIDINA 0.12% CON ADS NEW + DNA



Proprietà:
Azione antiplacca prolungata.
Mantiene le gengive in buono stato.
Rispetta il bianco dei denti.

Dentifricio TRATTAMENTO INTENSIVO CLOREXIDINA 0.20% CON ADS NEW+ DNA



Proprietà:
Azione antiplacca intensiva.
Rispetta il bianco dei denti.

Indicazioni:
Indicato come ausilio nel trattamento delle irritazioni delle gengive in soggetti portatori di protesi, apparecchi ortodontici, impianti e problemi al tessuto di sostegno del dente (parodonto). Prima e dopo qualsiasi trattamento odontoiatrico per proteggere le gengive. Si consiglia l'uso in abbinamento ai collutori Curasept ADS 0,12 e 0,20 con DNA.

Collutorio e Dentifricio
TRATTAMENTO LENITIVO
CLOREXIDINA 0.20% CON ADS NEW + CLOROBUTANOLO + DNA

Gel Parodontale
CLOREXIDINA 0.5% CON ADS NEW + CLOROBUTANOLO, PVP-VA + DNA



Proprietà:
Contribuisce a ridurre la sintomatologia irritativa e dolorosa della mucosa orale.
Rapida azione antiplacca. Mantiene le gengive in buono stato. Senza alcool.

Indicazioni:
Particolarmente indicato quando, oltre a una rapida azione antiplacca, è necessario associare una riduzione della sintomatologia irritativa della mucosa orale e gengivale, conseguenza anche di trattamenti odontoiatrici.

Collutorio e Dentifricio
TRATTAMENTO ASTRINGENTE
CLOREXIDINA 0.20% CON ADS NEW + HAMAMELIS + DNA

Gel Parodontale
CLOREXIDINA 0.5% CON ADS NEW + HAMAMELIS, PVP-VA + DNA



Proprietà:
Contribuisce a ridurre il sanguinamento gengivale. Mantiene le gengive in buono stato. Rapida azione antiplacca. Senza alcool.

Indicazioni:
Se ne consiglia l'uso in caso di: gengive delicate e facilmente sanguinanti, irritazione e arrossamento di mucose e gengive, irritazioni della lingua, irritazioni da alimenti duri, piccanti o molto caldi.

Collutorio e Dentifricio
TRATTAMENTO RIGENERANTE
CLOREXIDINA 0.20% CON ADS NEW + ACIDO IALURONICO + DNA

Gel Parodontale
CLOREXIDINA 0.5% CON ADS NEW + ACIDO IALURONICO, PVP-VA + DNA



Proprietà:
Contribuisce al ripristino naturale dei tessuti gengivali lesionati a seguito di intervento chirurgico/implantare o estrazione dentale. Rapida azione antiplacca. Mantiene le gengive in buono stato. Senza alcool.

Indicazioni:
Se ne consiglia l'uso in tutti casi dove è necessario aiutare a riparare e idratare le mucose trattate, assicurando il successo delle procedure odontoiatriche con risultati più soddisfacenti per il paziente ad esempio in presenza di: estrazioni dentali complesse, inserimento di impianti dentali, procedure di rigenerazione ossea, chirurgia plastica parodontale.

Collutorio e Dentifricio
TRATTAMENTO PROTETTIVO
CLOREXIDINA 0.20% CON ADS NEW + COLOSTRO + DNA

Gel Parodontale
CLOREXIDINA 0.5% CON ADS NEW + COLOSTRO, PVP-VA + DNA



Proprietà:
Coadiuvante nei trattamenti delle infezioni e infiammazioni della mucosa orale in soggetti vulnerabili o immunodepressi. Azione antiplacca rapida ed efficace. Mantiene le gengive in buono stato. Senza alcool.

Indicazioni:
Trattamento antiplacca particolarmente adatto in soggetti più predisposti a lesioni gengivali dovute a: bocca secca, farmaci, fumo, stress e carenze vitaminiche, debilitazione fisica da infezioni e patologie (influenza, infezioni intestinali, celiachia, coliti ulcerose...), manifestazioni acute di patologie, sindromi autoimmunitarie e fenomeni conseguenti a radioterapia.

MODALITÀ D'USO

Collutori: effettuare uno sciacquo per circa 1 minuto utilizzando un cucchiaio di prodotto non diluito (10 ml). Ripetere il trattamento due volte al giorno, mattina e sera, dopo i pasti. Usare il prodotto preferibilmente dopo la normale igiene orale e per rendere più efficace il sistema ADS NEW, si consiglia di non fumare e ridurre possibilmente l'assunzione di alimenti pigmentanti (caffè, tè...) per almeno un'ora dopo il trattamento. Proseguire con le applicazioni per 7-14 giorni.

Dentifrici: utilizzare il prodotto almeno due volte al giorno per 2 mesi. Se ne consiglia l'uso con uno spazzolino CURASEPT SOFT.

Gel Parodontali: applicare una piccola quantità di prodotto sulla zona interessata con il dito o delicatamente con l'apposito spazzolino CURASEPT SOFT, due volte al giorno per 7-10 giorni. Non risciacquare. Per l'applicazione interdentale utilizzare uno scovolino di dimensioni ridotte. In caso di fenomeni di ipersensibilità contattare il medico.

CURASEPT
FIRST BECAUSE WE CARE

CURASEPT S.p.A.
Via G. Parini, 19
21047 Saronno (VA) Italy
Tel. +39 02 96 227 99
Fax +39 02 96 709 243
info@curaseptspa.it
www.curasept.it

FOGLIETTO PAP 22
CARTA
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

XDP00030N - Rev. 15/02/2026